

โรคฝีดาษลิง

MONKEYPOX

ติดจากสัตว์สู่คน

เลือด สารคัดหลั่ง
ตุ่มหนองของสัตว์



รวมทั้งติดโรคจากคนสู่คน โดยสัมผัสสารคัดหลั่ง
สัมผัสแผลหรือใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเชื้อโดยตรง
และสามารถแพร่เชื้อจากหญิงตั้งครรภ์สู่ทารกในครรภ์ได้

แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่



1. ระยะฟักตัว จะไม่แสดงอาการช่วง 5 - 21 วันหลังจากได้รับเชื้อ
2. ระยะไข้ 1 - 4 วัน มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย
3. ระยะผื่น 1 - 2 สัปดาห์ จะเริ่มจากผื่นแบน ผื่นนูน ผื่นมีน้ำใสใต้ผื่น ผื่นมีน้ำขุ่นใต้ผื่น จนกระทั่งเป็นผื่นแผลแห้งเป็นขุย
4. ระยะฟื้นตัว ใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์

ป้องกันตนเอง

- 1 หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์
- 2 กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก
- 3 หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
- 4 ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่า และไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง

